

HERBICIDAS

PICLOXAN 15 EW:

Herbicida sistémico, selectivo. Contiene 7.5% de Picloram y 7.5 % de Floroxipir, recomendado para el control de malezas hojas anchas perennes, semileñosas, leñosas o arbustivas.

IMPACTUM 30.4 SL:

Herbicida sistémico, selectivo. Contiene 6.4% de Picloram y 24% de 2,4-D, recomendado para el control de malezas hojas anchas o perennes.

AMIXIL 60 WG:

Herbicida sistémico, selectivo. Contiene 60 % de Metsulfuron Metil, recomendado para el control de malezas hojas anchas, en pasto, césped y campo de golf.

LANCET 40 WG:

Herbicida sistémico, selectivo de contacto. Contiene 40 % de Carfentrazone Ethyl, recomendado para el control de malezas hojas anchas y ciperáceas.

HERLIN SUPER 46 SL:

Herbicida sistémico, selectivo de contacto. Contiene 40 % de Bentazona y 6 % de MCPA, recomendado para el control de hoja ancha y ciperáceas.

POTOMAC SUPER 40 SL:

Herbicida sistémico de acción post-emergente no residual. Contiene 30% Glifosato y 10% de Glufosinato de amonio. Recomendado para el control de malezas gramíneas, hojas anchas y ciperáceas.

ACONDICIONADORES DE AGUA

DISPERFOL 39 SL

Adherente coadyuvante con acción de adherencia, dispersión y penetración a la hoja, biodegradable y altamente compatible con los fitosanitarios, potencializando su efecto. Contiene 39 % de Poli Glicol. Recomendado para evitar el lavado por lluvia, mayor adherencia, dispersión y penetración en la aplicación de los productos herbicidas.

pH MASTER 71 SL

Regulador de pH y Dureza del agua. Tiene acción adherente, dispersante, humectante, penetrante, emulsificante y estabilizante de las mezclas de pesticidas.

RECOMENDACIONES:

Estas recomendaciones han sido confeccionado en base a las malezas que suelen estar presente en cada etapa del cultivo de caña de azúcar.

Las aplicaciones de estos productos solo se deben realizar luego de una correcta identificación de malezas, monitoreo de la dinámica poblacional y umbral económico de estas.

Un buen plan de manejo de malezas debe iniciar con la reducción de los depósitos del banco de semillas en el suelo y antes de que estas produzcan semillas (antes de la floración).

Siga el manejo de malezas con tácticas de control preventivo (cuarentenario o cultural) y curativo con controles (físico/mecánico, biológico y químico).

Con la aplicación del control químico, para su mezcla regule la dureza y el pH del agua y ponga al final Disperfol. Ponga primero los productos en polvo y luego los líquidos. La selección dependerá del tipo de malezas existente y su cobertura, humedad y tipo de suelo.

Antes de la aplicación de los productos lea detenidamente la etiqueta y el panfleto adjunto y siga las indicaciones del fabricante. Utilice el equipo de protección recomendado. Proteja su salud y el medio ambiente.

Para tolerancia de productos al cultivo y tiempo de espera antes de la cosecha, siga las instrucciones del país destinatario y su registro en el Ministerio de Agricultura. Toda aplicación es responsabilidad del usuario.

Cualquier duda consulte nuestro servicio técnico, estamos para servirle.

CALOSA

CASTILLO LORA SOLUCIONES AGRICOLAS, S.R.L.

📍 Ave. Buenaventura Freites N.º 16, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.

📍 Prolongación Ave. Rivas N.º 34, La Vega, Rep. Dominicana

☎ 809 472 0333

✉ info@calosa.com.do

🌐 www.calosa.com.do

📱 calosa_srl

PASTO



Guía para el control de malezas

CALOSA

Calidad en su cosecha

V.2022-1

Más pasto, sin malas hierbas!

Mayor producción de carne y leche!

MALEZAS DE HOJAS ANCHAS HERBÁCEAS

Anamú	<i>Petiveria alliacea</i>
Batatilla	<i>Ipomea spp</i>
Bejuco de Nigua	<i>Turnefortia spp</i>
Bledo	<i>Amaranthus spp</i>
Bruca	<i>Cassia spp</i>
Cadillo de Burro	<i>Triufetta spp</i>
Doña Ana	<i>Lantana camara</i>
Escoba amarga	<i>Sida spp</i>
Guayiga	<i>Zamia debilis</i>
Helechos	<i>Ptheridium aquilinun</i>
Tuatua	<i>Jatropha gossypifolia L</i>
Mala Mujer	<i>Acanthospenum spp</i>
Mata Puerco	<i>Diefenbachia spp</i>
Mori-vivi	<i>Mimosa pudica</i>
Pringamosa	<i>Tragia voluvilis</i>
Rompesaragüey	<i>Eupatorium spp</i>
Yerba amarga	<i>Parthenium spp</i>

MALEZAS DE HOJAS ANCHAS LEÑOSAS Y ARBUSTIVAS

Acacia	<i>Albizia lebbbeck</i>
Bayahonda	<i>Acacia farnesiana</i>
Bejuco Caro	<i>Cissus sicyoides</i>
Berenjenita	<i>Solanum torvum</i>
Cafetillo	<i>Amaioua corymbosa</i>
Caimito de Perro	<i>Chrisophyllum spp</i>
Cambrón	<i>Acacia macracantha</i>
Escobón	<i>Eugenia spp</i>
Guayaba	<i>Psidium guajaba</i>
Jabilla	<i>Hura crepitans</i>
Jobobán	<i>Trichilia hirta</i>
Juan Primero	<i>Simarouba spp</i>
Macarabomba	<i>Caseria aculeata</i>
Pino Macho	<i>Zanthoxylum spp</i>
Uña de Gato	<i>Pisonia aculeata</i>
Palo Blanco	

MALEZAS CIPERÁCEAS

Tres filos / Cortadera / Junquillo *Cyperus spp*

Observaciones

• Para el buen control de Guayiga y Helechos use 30 gramos de Amixil 60 WG + 1.5 a 2.0 litros de Picloxan 15 EW por tanque de 200 litros de agua.

• Aplique estos herbicidas cuando las malezas estén en pleno crecimiento, tengan más de tres hojas verdaderas y antes que florezcan. Las condiciones de humedad favorecen el efecto de los herbicidas.

MALEZAS LEÑOSAS Y ARBUSTIVAS

**PICLOXAN 15 EW
1.5 A 2 LITROS**

MALEZAS TRES FILOS, CORTADERA, COQUILLO

**LANCET 40 WG
100 GRAMOS**

ALTERNE CON

**HERLIN SÚPER 46 SL
2 LITROS**

MALEZAS LEÑOSAS Y ARBUSTIVAS

**IMPACTUM 30.4 SL + AMIXIL 60 WG
2 LITROS + 20 GRAMOS**

APLICACIÓN EN TOCONEO

**IMPACTUM 30.4 SL
3 A 4 LITROS**

PAJONES

**POTOMAC SÚPER 40 SL
(APLICACIÓN DIRIGIDA)
2 LITROS**

DOSIS/TANQUE DE 200 LITROS DE AGUA