

Desde la siembra hasta la cosecha, elige lo mejor.

ALTREX 50 SC

Herbicida pre y post-emergente temprano selectivo al cultivo de caña. Contiene 50% de **Ametrina**. Controla malezas gramíneas y de hojas anchas. Altamente efectivo contra Arrocillo, Paragüita, Pata de Gallina, Cadillo y Yerba de Hilo.

AMIXIL 60 WG

Herbicida sistémico, selectivo. Contiene 60 % de **Metsulfuron Metil**. Recomendado para el control de hojas anchas.

ASULOX 40 SL

Herbicida sistémico post-emergente, altamente selectivo al cultivo de caña. De acción lenta, pero segura. Sus efectos se ven después de 21 días de aplicado. Contiene 40% de **Asulam**. Alta efectividad contra todas las malezas gramíneas, como son: Yerba Páez, Pajones, Arrocillo gigante y enano, Yerba Guinea, Cebada, Pata de Gallina, Yerba de Hilo y otras.

DICAMIX 46.5 SL

Herbicida post-emergente, selectivo. Actúa de forma sistémica contra malezas de hojas anchas, anuales, semileñosas y leñosas. Contiene 12% de **Dicamba** y 34.5% de **2,4-D**. Alta efectividad contra Ajai, Fogaraté, Yerba de leche, Botoncillo, Batatilla, Bruca, Malva, Escoba, Alfiler y otras.

ISOLAN 75 WG:

Herbicida sistémico, selectivo pre-emergente. Contiene 75 % de **Isoxaflutole**, recomendado para el control de gramíneas y hojas anchas.

IMPACTUM 30.4 SL

Herbicida sistémico, selectivo. Contiene 6.4% de **Picloram** y 24% de **2,4-D**, recomendado para el control de malezas hojas anchas o perennes, especialmente lino en aplicación dirigida.

RECOMENDACIONES:

Estas recomendaciones han sido confeccionado en base a las malezas que suelen estar presente en cada etapa del cultivo de caña de azúcar.

Las aplicaciones de estos productos solo se deben realizar luego de una correcta identificación de malezas, monitoreo de la dinámica poblacional y umbral económico de estas.

Un buen plan de manejo de malezas debe iniciar con la reducción de los depósitos del banco de semillas en el suelo y antes de que estas produzcan semillas (antes de la floración).

Siga el manejo de malezas con tácticas de control preventivo (cuarentenario o cultural) y curativo con controles (físico/mecánico, biológico y químico).

Con la aplicación del control químico, para su mezcla regule la dureza y el pH del agua. Ponga primero los productos en polvo y luego los líquidos. La selección dependerá del tipo de malezas existente y su cobertura, humedad y tipo de suelo.

Antes de la aplicación de los productos lea detenidamente la etiqueta y el panfleto adjunto y siga las indicaciones del fabricante. Utilice el equipo de protección recomendado. Proteja su salud y el medio ambiente.

Para tolerancia de productos al cultivo y tiempo de espera antes de la cosecha, siga las instrucciones del país destinatario y su registro en el Ministerio de Agricultura. Toda aplicación es responsabilidad del usuario.

Cualquier duda consulte nuestro servicio técnico, estamos para servirle.



📍 Ave. Buenaventura Freites N.º 16, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.

📍 Prolongación Ave. Rivas N.º 34, La Vega, Rep. Dominicana

☎ 809 472 0333

✉ info@calosa.com.do

🌐 www.calosa.com.do

📱 calosa_srl

Guía para el control de malezas

Caña de azúcar



Desde la siembra hasta la cosecha, elige lo mejor.

HEXACTO 75 WG

Herbicida no selectivo. Actúa por contacto y se absorbe por las hojas y raíces. Contiene 75% de **Hexazinona** es altamente efectivo para el control de pajones en mezcla con Natium en aplicación dirigida.

METALUX 40 SC

Herbicida de preemergencia y postemergencia para contacto selectivo y control residual de malezas de hoja ancha y algunas gramíneas en caña de azúcar. Contiene 40% de **Mesotrione**. Se absorbe a través de las hojas, se trasloca por toda la planta y finalmente, causa la muerte de la maleza.

NATIUM 48 EC

Herbicida selectivo que actúa en forma sistémica contra malezas gramíneas y algunas de hojas anchas. Contiene 48% de **Clomazone**. Se absorbe rápidamente por hojas raíces traslocándose por toda la planta, es altamente efectivo para el control de pajones en mezcla con Hexacto en aplicación dirigida.



RETOÑO	MOMENTO APLICACIÓN	CONTROL	PRODUCTOS	DOSIS/ACRE	DOSIS/HA
	Aplique entre 1 a 15 días despues del corte de la caña	Gramineas y Hojas anchas	DICAMIX 41 SL ALTREX 50 SC AMIXIL 60 WG	0.6 L- 0.8 L 2.0 L - 3.0 L 8 g - 10 g	1.5 - 2.0 L 5.0 - 7.5 L 20 g - 25 g
	Aplique sobre malezas mayor de 5 a 8 hojas o 30 cms de altura.	Gramineas y Hojas anchas	DICAMIX 41 SL	0.6 L - 1.0 L	1.5 L - 2.5 L
	Aplique de 45 a 60 días del cierre de la caña en post-emergencia tardía.	Gramineas y Hojas anchas	ASULOX DICAMIX 41 SL	2.0 - 3.0 L 0.6 L- 1 L	5.0 - 7.5 L 1.5 L - 2.5 L
	Aplique de 45 a 60 días del cierre de la caña en post-emergencia tardía.	Gramineas y Hojas anchas	ISOLAN 75 WG METALUX 40 SC	80 g 0.2 L	200 g 0.5 L

PLANTILLA	MOMENTO APLICACIÓN	CONTROL	PRODUCTOS	DOSIS/ACRE	DOSIS/HA
	Aplique con malezas de 3 a 5 hojas o 20 cms de altura y después de la emergencia de la caña. En post-emergencia temprana de la maleza.	Gramineas y Hojas anchas	DICAMIX 41 SL ALTREX 50 SC	600 cc - 1.0 L 1.5 - 2.0 L	1.5 L - 2.5 L 3.5 - 5 L
	Aplique antes de la emergencia de la caña. En pre y pos-emergente temprano de la maleza, de 1 a 15 días.	Gramineas y Hojas anchas	METALUX 40 SC ALTREX 50 SC	0.2 L 1.5 - 2.0 L	0.5 L 3.5 - 5.0 L
	Aplique con maleza de 5 a 8 hojas o 30 cms de altura y después de la emergencia de la caña. En post-emergencia tardía de las malezas. De 70 a 90 días del cierre de la caña.	Gramineas y Hojas anchas	ASULOX 40 SL DICAMIX 41 SL	2.0 - 2.5 L 600 cc - 1 L	5.0 - 6.0 L 1.5 L - 2.5 L
	Aplique antes de la emergencia de la caña y de las malezas	Gramineas y Hojas anchas			

RESCATE	MOMENTO APLICACIÓN	CONTROL	PRODUCTOS	DOSIS/ACRE	DOSIS/HA
	Aplique en post-emergencia tardía, sobre malezas mayor de 5 a 8 hojas o 30 cms de altura y después de la emergencia de la caña.	Yerba Paez, Guinea, Hojas Anchas, otras	ASULOX 40 SL DICAMIX 41 SL AMIXIL 60 WG	2.0 - 3.2 L 0.6 L 10 g	5.0 - 8.0 L 1.5 - 2.5 L 25 g
	MOMENTO APLICACIÓN	CONTROL	APLICACIÓN DIRIGIDA	DOSIS/200 L DE AGUA	
	Aplique en post-emergencia tardía, sobre malezas mayor de 5 a 8 hojas o 30 cms de altura y después de la emergencia de la caña.	Pajónes (Gramíneas)	NATIUM 48 EC HEXACTO 75 WG	1.25 L 0.6 kg	
	MOMENTO APLICACIÓN	CONTROL	APLICACIÓN DIRIGIDA	DOSIS/1 L DE AGUA	
	Aplique en post-emergencia tardía, sobre malezas mayor de 5 a 8 hojas o 30 cms de altura y después de la emergencia de la caña.	Lino (Hoja ancha)	IMPACTUM 30.4 SL	40 cc	



“Utilice estos productos para aumentar la eficacia de los herbicidas”.

Para más información visite www.calosa.com.do

ALBAZINC
Bioactivador foliar a base de una mezcla equilibrada de aminoácidos y zinc. Recomendado en todas las aplicaciones y momentos. Potencializa la acción de los herbicidas y los hace más selectivos. **Dosis: 250 cc / 200 litros de agua.**

BANOLE 100 SO
Coadyuvante a base de aceite parafínico que adhiere la mezcla de los herbicidas al cultivo, evita la evaporación y la deriva al momento de su aplicación. **Dosis: 1 litro/ 200 litros de agua.**

pH MASTER 71 SL
Regulador de pH y Dureza del agua. Tiene acción adherente, dispersante, humectante, penetrante, emulsificante y estabilizante de las mezclas de pesticidas. **Dosis: 250 cc / 200 litros de agua.**